

Рассмотрена и одобрена на заседании  
Совета по ветеринарным препаратам  
«20» октября 2017 г. Протокол № 92.

**Инструкция  
по применению препарата ветеринарного  
«Мазь стрептоцидовая 10 %»**

**1 Общие сведения**

- 1.1 Мазь стрептоцидовая 10 % (Unguentum streptocidi 10 %).
- 1.2 В 1 г препарата содержится 0,1 г стрептоцида в качестве действующего вещества и 0,9 г вазелина медицинского или ветеринарного в качестве формообразующего вещества.
- 1.3 Мазь представляет собой густую массу от белого до желто - коричневого цвета, со слабым ароматическим запахом.
- 1.4 Мазь выпускают по 100, 200, 400, 800 и 1000 г в полимерной таре.
- 1.5 Препарат хранят в сухом, защищенном от света месте при температуре от плюс 4 °C до плюс 25 °C.
- 1.6 Срок годности препарата - 4 года от даты изготовления, при условии соблюдения правил хранения.

**2 Фармакологические свойства**

2.1 Механизм действия основан на способности активного компонента препарата нарушать процесс ассимиляции факторов роста (дигидрофолиевой и фолиевой кислоты, а также других веществ, в состав молекулы которых входит парааминобензойная кислота) микробной клеткой. Мазь нарушает внутриклеточный метаболизм микроорганизмов, приводя к нарушению роста и развития чувствительных штаммов. Уменьшаются процессы экссудации, ускоряется регенерация поврежденной ткани.

**3 Порядок применения препарата**

- 3.1 Мазь применяют для всех видов сельскохозяйственных животных, кошек, собак, пушных зверей наружно при лечении ран, язв, ожогов, трещин сосков вымени.
- 3.2 Мазь наносят тонким слоем непосредственно на поврежденную поверхность или под марлевую повязку 1-2 раза в день до заживления.
- 3.3 При лечении трещин сосков вымени мазь наносят тонким слоем после доения в течение 3 - 5 дней.
- 3.4 Мазь не вызывает осложнений и не оказывает побочного действия.
- 3.5 Не рекомендуется применять препарат совместно с новокаином, анестезином, серно-салциловой мазью и другими препаратами серы.
- 3.6 Противопоказанием к применению препарата является повышенная индивидуальная чувствительность животного к сульфаниламидам.
- 3.7 Убой животных на мясо и использование молока в пищу людям не требует срока ожидания.

**4 Меры личной профилактики**

- 4.1 При работе с препаратом следует соблюдать правила личной гигиены и техники безопасности.

**5 Порядок предъявления рекламаций**

5.1 В случае возникновения осложнений после применения препарата, его использование прекращают, и потребитель обращается в Государственное ветеринарное учреждение, на территории которой он находится.

Ветеринарными специалистами этого учреждения производится изучение соблюдения всех правил по применению препарата в соответствии с инструкцией. При подтверждении выявления отрицательного воздействия препарата на организм животного, ветеринарными специалистами отбираются пробы в необходимом количестве для проведения лабораторных испытаний, пишется акт отбора проб и направляется в Государственное учреждение «Белорусский государственный ветеринарный центр» (г. Минск, ул. Красная 19 а, тел. 290-42-75) для подтверждения на соответствие нормативным документам.

**6 Полное наименование производителя**

6.1 Общество с ограниченной ответственностью "ТМ" (Республика Беларусь)  
220037, г. Минск, 1-й переулок Твердый, 13, помещение 1.  
Инструкция разработана сотрудником ООО "ТМ" Пригуном А.Г.

Департамент ветеринарного и продовольственного

надзора Министерства сельского хозяйства и

продовольствия Республики Беларусь

Совет по ветеринарным препаратам

ОДОБРЕНО

Председатель

Секретарь

Эксперт

20 10 2017 г. протокол № 92